

TAbic® IB Var bảo hộ khỏi sự tấn công đối với chủng Trung Quốc Yn05-1 (Chủng A2)

Công nghệ mới:

TAbic® IB Var: vaccine sống dạng viên sủi, được đóng kín trong vỉ nhôm vô trùng.

Dễ dàng sử dụng:

TAbic® IB Var: hòa tan nhanh chóng, virus sống phân tán đều trong dung dịch nước pha.

Tiện lợi cho người dùng:

TAbic® IB Var: thân thiện, tiện lợi và an toàn để xử lý (Không cần dụng cụ mở, xi-lanh hoặc các thiết bị khác để chuẩn bị vaccine).

Thân thiện với môi trường:

TAbic® IB Var: thân thiện với môi trường, vỉ rỗng có thể dễ dàng xử lý. Không có dư lượng trong vỏ ảnh hưởng đến môi trường.

Tiết kiệm chi phí vận chuyển và lưu trữ:

Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và dễ dàng vận chuyển

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM LÂM
ĐC : Số 85 Đường Số 9, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Tp.HCM
ĐT : 84.028.62608935 - MST : 0301049746
Email : conamlam@gmail.com - Website : thuynamlam.com

TAbic® IB VAR

Vaccine sống IB biến chủng(793B)

Chủng vaccine 1 ngày tuổi cho sự an toàn 100%

Phibro ANIMAL HEALTH CORPORATION TM

TAbic® IB Var

Vaccine sống phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm nhóm 793B.
Bảo vệ sớm, nhanh và mạnh mẽ chống lại các chủng IB biến thể.

TAbic® IB Var: Vaccine sống chủng 233A của virus gây bệnh viêm phế quản truyền nhiễm đã được làm suy yếu từ một dòng IB thực địa (Is233) thuộc nhóm 793B.
Các thử nghiệm trên gà thương phẩm trong điều kiện vô trùng đã chứng minh rằng:

* **TAbic® IB Var:** Kiểm soát bệnh IB với các biến thể trên hệ hô hấp, thể thận và sinh sản.
* **TAbic® IB Var:** Tạo sự bảo hộ chéo cho một số chủng IB biến thể khác.
* **TAbic® IB Var:** Được điều chế ở dạng viên sủi thuận tiện và có thể chủng cho tất cả các loại gà.
* **TAbic® IB Var:** Có thể cấp bằng phương pháp nhỏ mắt, phun dạng hạt và phun sương. Gà 1 ngày tuổi vẫn an toàn khi sử dụng phương pháp phun hạt hoặc nhỏ mắt.
* **TAbic® IB Var:** Không ảnh hưởng đến vaccine NDV sống khi sử dụng đồng thời.
* **TAbic® IB Var:** Tạo sự bảo hộ tốt hơn khi thử nghiệm so với chủng tương đồng 793B (chủng 1365).



Gà vô trùng (SPF) được chủng ngừa bằng cách nhỏ mắt lúc 14 ngày tuổi và gây bệnh lúc 35 ngày. Các kết quả gây bệnh đã được đánh giá bằng test cilliostasis.

TAbic® IB Var

Vaccine phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm dạng viên sủi.
Vaccine sống dạng viên sủi một cuộc cách mạng công nghệ về vaccine IB sống

4 nhóm gà SPF được sử dụng trong thí nghiệm. Nhóm 1 được chủng **TAbic® IB Var** 2 lần lúc 1 và 14 ngày tuổi. Nhóm 2 được chủng H120 lúc 1 ngày và **TAbic® IB Var** lúc 14 ngày tuổi. Hai nhóm khác gồm: Không tiêm vaccine - gây bệnh và không tiêm vaccine - không gây bệnh, được xem như là lô đối chứng. Các nhóm đã được gây bệnh với chủng YN05-1 ở 35 ngày tuổi để quan sát các dấu hiệu lâm sàng và đánh giá tỷ lệ chết.

100% gà được bảo hộ khi đã được làm 2 lần với vaccine **TAbic® IB Var**



Gà được chủng hai lần với **TAbic® IB Var** cho thấy những dấu hiệu lâm sàng tối thiểu và không có bệnh lý thận hoặc phổi.